



เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เชื้อนี้ทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อต่าง ๆ และแอลกอฮอล์ได้ดี จึงไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสนี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ง่ายแม้ร่างกายได้รับเชื้อในปริมาณเล็กน้อย และใช้เวลาไม่นานในการแพร่กระจายเชื้อ

โนโรไวรัสระบาดมากในช่วงฤดูหนาว และพบบ่อยในกลุ่มเด็ก หรือตามสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น สถานเลี้ยงเด็ก โรงเรียน แคมป์ก่อสร้าง และโรงพยาบาล

อาการ

เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร โดยเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะอาศัยอยู่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้น และทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และเกิดความผิดปกติของการดูดซึมไขมันและน้ำตาลของลำไส้เล็ก มีระยะฟักตัวสั้น 12 – 48 ชั่วโมง หลังรับเชื้อ จึงมักจะเข้าใจผิดว่าอาหารเป็นพิษ มีอาการคล้ายกัน คือ อาเจียนรุนแรง ปวดมวนท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ไข้ต่ำ ๆ และจะมีอาการรุนแรงในเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ

การติดต่อ

สามารถติดต่อได้ง่ายจากคนสู่คน ด้วยพฤติกรรม ดังนี้

การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อน โดยเฉพาะอาหารที่ปรุงไม่สุก เช่น อาหารทะเล ผัก ผลไม้สดที่ล้างไม่สะอาด



การสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้ออยู่แล้ว นำนิ้วเข้าปาก โดยเฉพาะในเด็ก



การหายใจใกล้กับผู้ป่วยที่อาเจียน และหายใจเอาละอองอาเจียนของผู้ป่วยเขาไป



การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาเชื้อไวรัสนี้ โดยเฉพาะ เป็นการรักษาตามอาการ เช่น การให้สารน้ำและเกลือแร่ทดแทน ถ้ามีภาวะขาดน้ำ เป็นต้น




วัคซีนป้องกันโรค

ปัจจุบันมีวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ ในประเทศไทย 2 ชนิด คือ วัคซีนชนิด 1 สายพันธุ์ ทยอย 2 ครั้ง เมื่ออายุ 2 และ 4 เดือน และวัคซีนชนิด 5 สายพันธุ์ ทยอย 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2 , 4 และ 6 เดือน โดยวัคซีนสามารถลดการป่วยหรือลดความรุนแรงของโรคได้

วัคซีนไวรัสโรต้า



วัคซีนนี้สามารถให้ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ ได้โดยสามารถนำบุตรหลาน อายุ 2 เดือน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีไปรับการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้า ฟรีที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักงานอนามัยทุกแห่ง



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
โทร 037-279-529



อุจจาระร่วงจาก ไวรัสโรต้า



ไวรัส (Rotavirus) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง ส่วนใหญ่มักหายเองได้ เด็กเล็กและผู้สูงอายุ อาจมีความรุนแรงของโรคมากกว่ากลุ่มอื่น

